

# Yeni Tanı Hodgkin Lenfoma Tedavisinde Standart Deđiřti mi?

Prof. Dr. Ferit AVCU

Memorial Ankara Hastanesi  
Hematoloji ve KİT Merkezi

# Hodgkin Lenfoma Tedavisinde Tarihçe:

## ADVANCEMENTS IN HL TREATMENT

1980s

ABVD, MOPP & Stanford V are standard FL HL treatment options



2000s

PET scanning introduced & initiation of PET-adapted study designs in HL



2012

EU Approval of the 1st new agent for r/r HL in over 30 years



1990s

Emergence of BEACOPP as a new therapeutic option. Introduction of involved field radiation in FL HL



2010s

First PD-1 receptor blocking antibodies enter clinical trials



2016

EU Approval of the 1st HL consolidation treatment post-ASCT



2017 2020

Yeni Tanı Hodgkin Lenfoma Tedavisinde Değişen Standartlar



# Yeni Tanı Hodgkin Lenfoma Tedavisinde Değişebilecek Standartlar:

## SONUÇ-YORUM

- Klasik Hodgkin lenfomalı hastaların tedavisinde PET yönlendirmeli tedavi kombinasyonları en uygun seçenek olarak gözükmemektedir.
- Yeni tanı Evre III-IV Hodgkin Lenfomalı Hastaların Tedavisinde Brentixumab Vedotin'li Kemoterapi (A+AVD) klasik ABVD'ye göre hastalıksız sağkalıma kısmen katkı sağlamıştır (ECHELON-1). Bleomisin yan etkisi fazla olan hastalarda en seçkin kombinasyondur.
- Yeni tanı ileri evre klasik Hodgkin lenfomalı hastaların tedavisinde PD-1 inhibitörleri (nivolumab ve pembrolizumab) eklenmiş AVD kombinasyonu hastalıksız yaşam ve toplam yaşam süresine olumlu katkı sağlamaktadır.
- Nodüler lenfosit baskın Hodgkin lenfomalı hastalarda Rituximab + kemoterapi kombinasyonunun uzun süreli takipleri en iyi hastalıksız yaşam ve ortalama yaşam süresi sağlayan seçenek olarak gözükmemektedir.